

# Instituto de Química (IQ)

CCMN - *Centro de Ciências Matemáticas e da  
Natureza*

Mapeamento dos espaços de atividades  
didáticas práticas na graduação da UFRJ



# IQ/CCMN

## Quadro de classificação

Nº da sala/laboratório	Possibilidade de atividade remota	Possibilidade de distanciamento físico	Classificação	EPIs	Periodicidade de troca	Ocupação antes da pandemia (pessoas)	Ocupação em contexto de pandemia (pessoas)
401	Sim	Sim	Risco Baixo/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	20	29
403	Sim	Sim	Risco Médio/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	12	4
409	Sim	Sim	Risco Baixo/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	20	24
501	Não	Sim	Risco Baixo/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	18	23
502	Não	Sim	Risco Médio/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	18	25
503	Não	Sim	Risco Baixo/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	18	25
504	Não	Sim	Risco Baixo/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	18	21

Em qualquer um dos ambientes, recomenda-se o uso de *face shield*. durante a realização de procedimentos que promovam a geração de gotículas e aerossóis.

# IQ/CCMN

## Quadro de classificação

Nº da sala/laboratório	Possibilidade de atividade remota	Possibilidade de distanciamento físico	Classificação	EPIs	Periodicidade de troca	Ocupação antes da pandemia (pessoas)	Ocupação em contexto de pandemia (pessoas)
505	Não	Sim	Risco Médio/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	18	18
509	Não	Sim	Risco Baixo/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	10	13
511	Não	Sim	Risco Baixo/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	16	20
525	Não	Sim	Risco Baixo/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	15	8
531	Não	Sim	Risco Baixo/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	12	14
533	Não	Sim	Risco Baixo/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	12	14
619	Não	Sim	Risco Médio/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	18	37

Em qualquer um dos ambientes, recomenda-se o uso de *face shield*. durante a realização de procedimentos que promovam a geração de gotículas e aerossóis.

# IQ/CCMN

## Quadro de classificação

Nº da sala/laboratório	Possibilidade de atividade remota	Possibilidade de distanciamento físico	Classificação	EPIs	Periodicidade de troca	Ocupação antes da pandemia (pessoas)	Ocupação em contexto de pandemia (pessoas)
620	Não	Sim	Risco Médio/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	18	22
623	Não	Sim	Risco Médio/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	18	36
625	Não	Sim	Risco Médio/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	16	25
628	Não	Sim	Risco Médio/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	20	14
631	Não	Sim	Risco Médio/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	24	37
639	Não	Sim	Risco Médio/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	20	40
531-A	Não	Sim	Risco Baixo/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	12	12

Em qualquer um dos ambientes, recomenda-se o uso de *face shield*. durante a realização de procedimentos que promovam a geração de gotículas e aerossóis.

# IQ/CCMN

## Quadro de classificação

Nº da sala/laboratório	Possibilidade de atividade remota	Possibilidade de distanciamento físico	Classificação	EPIs	Periodicidade de troca	Ocupação antes da pandemia (pessoas)	Ocupação em contexto de pandemia (pessoas)
614A	Não	Sim	Risco Baixo/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	12	16
Pólo Xistoquímica-Laboratório LabiPetro	Não	Sim	Risco Médio/ Exposição Média	Máscara de tecido ou cirúrgica.	A cada duas ou três horas ou quando estiver úmida, com sujidade, danificada ou se houver dificuldade para respirar.	5	8
						<b>370</b>	<b>485</b>

Em qualquer um dos ambientes, recomenda-se o uso de *face shield*. durante a realização de procedimentos que promovam a geração de gotículas e aerossóis.

# IQ/CCMN

## Validação da área útil

Nº da sala/laboratório	Área útil (m²)
401	66,80
409	55,08
501	53,40
502	56,70
503	57,00
504	48,00
509	30,50
511	45,50
531	32,13
533	33,29
619	84,17
620	51,49
623	82,42
625	56,92
631	84,14
639	90,33
614A	37,59
Pólo Xistoquímica- Laboratório LabiPetro	20,00

Os espaços relacionados requer validação da área útil informada visto que a ocupação em contexto de pandemia é maior que antes da pandemia, considerando o distanciamento interpessoal de 1,5 m adotado pela UFRJ.

# IQ/CCMN

## Validação da área efetiva de ventilação

Nº da sala/laboratório	Ventilação Janelas (m <sup>2</sup> )	Ventilação Portas (m <sup>2</sup> )	Ventilação Total (m <sup>2</sup> )
Pólo Xistoquímica- Laboratório LabiPetro	5,76	3,37	7,85

O espaço relacionado requer validação da área efetiva de ventilação total, visto que tal área não corresponde ao somatório das áreas efetivas de ventilação de portas e janelas.